



EIKENPROCESSIERUPS

- Rups van de eikenprocessievlinder
- Leeft op eiken, eet eikenblad
- Komt in heel Nederland voor
- Verspreidt brandhaartjes die irritatie veroorzaken

Symptomen

De brandhaartjes veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk en heel soms ook braken, duizeligheid en koorts.

Wijze van grimeren

Licht rode, eventueel licht gespikkelde (plaats van haartjes rups) verkleuring van de huid met lichte krabeffecten. Maak met de kwast kleine puntjes en (krab)strepen, vervaag deze vervolgens met het vochtige doekje.

Benodigdheden:

- Wondbodempasta
- Dunne kwast met stevig haar
- Vochtig doekje

KWALLENSTEEK

- Netelcellen
- Jeuk
- (Paniek)

Een kwal is een bepaalde vorm van vrij zwemmende holtedieren met een zacht, doorschijnend, vaak fraai gekleurd klok- of parapluvormig lichaam en tentakels. In de Noordzee komt vooral de oorkwal, de kompaskwal en de blauwe haarkwal voor. Kwallen hebben netelcellen aan tentakels. Deze netelcellen lijken op harpoentjes en vuren een 'pijlte' af de huid in, waardoor een branderig gevoel ontstaat.

Wijze van grimeren

Bij contact met kwal grimeren met rood afdruk aanraking (als bij contactverbranding). Maak met de kwast grillige dunne strepen, vervaag deze vervolgens met het vochtige doekje.

Benodigdheden:

- Wondbodempasta
- Dunne kwast met stevig haar
- Vochtig doekje

HERSENVLIESONTSTEKING

Een ernstig ziektebeeld dat door velerlei oorzaken kan ontstaan, bijv. als complicatie bij verwondingen van het schedeldak en gekenmerkt wordt door hoofdpijn, nekstijfheid en koorts.

Acteren en symptomen

Acuut begin met heftige hoofdpijn, bewustzijnsstoornissen, eventueel verwardheid, vaak braken, later bewusteloosheid. Duidelijke nekstijfheid. Vaak hoge temperatuur (koorts). Epileptiforme aanvallen kunnen eveneens voorkomen.



Blz. 52, 6e regel van onderen

Tweedegraads bevrozing: een bleek-grijze huidkleur met blarenviolet van kleur, stekende pijn en later ontstaan blaren, veranderen in:

Tweedegraads bevrozing: een bleek-grijze huidkleur. De blaren, die pas later ontstaan (10 à 12 uur), zijn violet van kleur, stekende pijn.

Blz. 133, 9e regel van boven

De mondhoek aan de aangedane zijde hangt etc., veranderen in:

De mondhoek aan de aangedane zijde (= locatie beroerte) hangt etc.